

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT – RECOLTARE PROBE BIOLOGICE

1. Datele pacientului	Numele și prenumele		
	Domiciliul / Reședința:		
	Cod numeric personal (CNP):		
	Numar de telefon: Adresa de email:		
2. Reprezentantul legal al pacientului*	Numele și prenumele:		
	Domiciliul / Reședința:		
	Calitatea:		
* Se utilizeaza in cazul minorilor si majorilor fara discernamant (pentru art 8 alin. (3) - (5) din normele metodologice).			
3. Actul medical (descriere) 4. Data efectuării 5. Consimțământ pentru recoltare	Recoltare probe biologice		

	Pacientul este de acord cu recoltarea, pastrarea si folosirea produselor biologice		DA
Declar totodata ca am fost informat cu privire la gradul de eroare al testarii, intelegand ca acesta este asumat de catre producator, fara implicarea SC Centrul de Diagnostic si Tratament Provita SRL		DA	NU
<i>**va rugam sa cititi informatiile de pe verso</i>			
6. Investigatii solicitate 7. Timp de executie	<input type="checkbox"/> Detectie SARS – CoV - 2 - Real - Time RT – PCR		
	<input type="checkbox"/> 12 ore <input type="checkbox"/> 24 ore <input type="checkbox"/> 24 – 48 ore <input type="checkbox"/> 72 ore	<input type="checkbox"/> Limba Romana <input type="checkbox"/> Limba Engleza	
8. Comunicare	Inteleg ca rezultatul analizelor de laborator va fi disponibil online la adresa www.centrul-provita.ro in baza codului de utilizator si a parolei de acces ce imi vor fi furnizate o data cu cererea de analize, dupa expirarea termenului de executie ce mi-a fost comunicat.		

** INFORMATII CU PRIVIRE LA GRADUL DE EROARE AL TESTARII

Testul utilizează amplificarea ARN viral (gena E, gena RdRp și gena N) a virusului SARS-COV-2.

Rezultatul reprezintă statusul viral din momentul recoltării, astfel un rezultat sau mai multe rezultate nedetectabile nu exclud posibilitatea existenței infecției cu Covid-19.

Unul sau mai multe rezultate negative, în special din probe prelevate de la nivelul tractului respirator superior, nu exclud posibilitatea infecției cu SARS-CoV2.

Un rezultat fals-negativ poate fi explicat prin:

- probă recoltată prea devreme sau prea târziu în cursul infecției;

- apariția de mutații la nivelul virusului sau a inhibitorilor în reacția PCR. La pacienții cu suspiciune fermă de infecție cu SARS-CoV-2 se pot preleva și testa probe suplimentare de la nivelul tractului respirator inferior.

Identificarea unui alt patogen nu exclude infecția cu noul coronavirus, rolul coinfecției în patologie nefiind pe deplin cunoscut.

Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă repetarea prelevării până la negativarea rezultatelor la două testări consecutive prin reacții de amplificare genică.

Semnatura mea reprezintă faptul că am fost informat și sunt de acord cu informațiile din prezentul formular.

Data _____ Semnatura: Pacient / Reprezentant legal: _____